

Instrucciones Para Despues de un Puente y Coronas Temporales

Por favor sigua estas instrucciones mientras espera por su corona o Puente permanente. No dude en llamar a nuestra oficina si tiene alguna pregunta sobre su procedimiento.

1. Evite comer comidas pegajosas (caramelo, goma de mascar, dulces duros) del lado de su corona temporal.
2. No use el hilo dental alrededor de su corona temporal. Si encuentra necesario hacerlo, ponga el hilo dental entremedio de sus dientes y deslice suavemente. Si lo hala bruscamente puede causar daño a su corona temporal.
3. Su corona temporal es importante para proteger su diente y el espacio. Si ocurre algun daño o se despega llame a nuestra oficina.
4. Si se despega su corona temporal mientras esta de viaje, compre cemento dental temporario en la farmacia. Remueva cualquier residuo de cemento seco, limpie bien su corona, y ponga una pequeña cantidad de cemento. Procure remover el cemento de sus encias.
5. Es normal sentir molestia alrededor del area trabajada debido a la anestesia o tener su boca abierta por mucho tiempo. Deberia cesar en pocos dias o en algunos casos semanas. Si su molestia o disconformidad progresa llame a nuestra oficina.
6. Si es necesario use Ibuprofen (Advil, Motrin) 1-2 tabletas cada 4-6 horas si siente molestia.
7. Si siente sensibilidad en las encias alrededor del area trabajada enjuague su boca con agua tibia y sal.

Por favor llame si tiene alguna pregunta o preocupacion.

817-510-2960

Despues de horas: 682-228-9088

Brown Trail Dental

1404 Brown Trail, Ste. C

Bedford, TX 76022

817-510-2960 (Office)

628-228-9088 (Cell)